

1  
15  
48

1856

**CATALOGUE RAISONNÉ**  
— et —

**PRIX-COURANT**

**DES PLANTES ET GRAINES**

du

**JAPON**


*cultivées dans l'établissement*

de

**von Siebold & Comp.**

à

**LEIDE.**



**Leide & Bonn.**

chez

**HENRY & COHEN.**







1857.

EXTRAIT DU CATALOGUE RAISONNÉE

ET

Prix-Courant

DES PLANTES DU JAPON,

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

van Siebold & Comp.

à

LEIDE.

Arbres et Arbrisseaux.		fr.		fr.
ACACIA Nemu, jeunes plantes semis	15		DESMODIUM racemosum. ....	Édition
AMPELOPSIS heterophylla, fol. im-			(trois plantes mères).	
maculatis. ....	5		EDGORTHIA cartacea. ....	10
ARDISIA Manrjô, bacc. alb. f. marg.	Édition		EVONYMUS alatus. ....	5—10
(deux plantes mères).			INDIGOFERA Iwafusi. ....	5—10
ARDISIA Manrjô, bacc. rubr. ....	Édition		LITSAEA glauca. ....	3
(une plante mère).			LONICERA brachypoda. ....	2
ARDISIA Manrjô, bacc. flav. ....	Édition.		(remède approuvé diurétique).	
(une plante mère).			MACHILUS Thunbergii. ....	Édition
ARMENIACA Mume, praecocissima.	25		(deux plantes mères).	
pendula. ....	25		MALUS spectabilis, var. jap. ....	10
virgata. ....	25		Toringo. ....	5
AUCUBA japonica, foliis grosso-			floribunda. ....	10
serratis. ....	30		Ringo. ....	10
BAMBUSA aurea. ....	3		MARLEA platanifolia. ....	10
nigra. ....	3		begoniaefolia. ....	10
BROUSSONETIA Kazinoki. ....	2		NANDINA domestica, major. ....	12
CAMELLIA Ida. ....	6		PHYLLOSTACHYS bambusoides. ....	1—3
Princesse Amélie. ....	15		PUNICA granatum, flor. pl. punic.	
Sassanqua, albo-purpurea	15		alb. variegat. ....	10
CAMPORA officinalis, latifolia...	25		QUERCUS acuta. (une plante mère).	Édition
CATALPA Kaempferi, vera, semis.	10		glabra. ....	5—10
CELASTRUS Orixia. ....	3		RAPHIOLEPIS japonica.	
CHAENOMELES japon., umbilicata.	1—3		RHUS succedanea, semis. ....	15
CLEMATIS Sieboldii. ....	2		(Véritable arbre à cire).	
patens Helena, pl. à fleur.	1		RHUS vernicifera. ....	30
Sophia, id.	1		(Véritable arbre à vernis).	
monstrosa, id.	1		ROTTLEA japonica. ....	Édition
			(2 plantes mères et 2 boutures)	



	fr.
ROSA rugosa. ....	1
hystrix. ....	5
RUBUS triphyllus. ....	5
SPIRAEA rupestris. ....	1—2
TECOMA Thunbergii. ....	3—5
TETRANTHERA japonica. ....	10—15
ULMUS Keaki. ....	3—6
VIBURNUM plicatum. ....	5
macrocephalum. ....	6—10
VITIS Thunbergii. ....	10
WISTERIA sinensis macrobotrys	
japonica	
brachybotrys	
multijuga	

#### Conifères du Japon.

CEPHALOTAXUS drupacea, à tête.	8—15
pedunculata, à tête	10—15
JUNIPERUS japonica. ....	2—5
procumbens. ....	2—5
PINUS Massoniana, semis. ....	25
densiflora, semis. ....	25
PODOCARPUS Coraïana. ....	3—5
SALISBURIA adianthifol., semis jap.	5
TORREJA nucifera. ....	3

#### Palmera du Japon.

CHAMAEROPS excelsa, vera. ....	50
RHAPIS Kwanwon. ....	6—10
aspera. ....	10—15

#### Pivoines en arbre.

PAEONIA Moutan, Germania. ....	2—5
Impératrice de France. ....	15—25
Princesse Marie des Pays-Bas	Édition
(trois plantes mères à fl. blan-	
ches doubles).	
Un assortiment de six variétés	
des nos pivoines du Japon d'après	
notre choix avec noms. ....	60

#### Plantes vivaces et bulbenses.

AMARYLLIS aurea, var. jap. ....	5
ARISAEMA ringens praecox. ....	5—15
serotinum. ....	3—10
ringens Sieboldii. ....	10—25
Konjak, (tubercule comestible)	5—10
ARTEMISIA Moxa, p. douzaine ..	6

	fr.
ASPIDIUM (Pycnopteris) Sieboldii.	6
ASPIDISTRA elatior, angustifolia. Édition	
(trois plantes mères).	
ASPIDISTRA auro-punctata. ....	Édition
(huit plantes mères).	
ASPIDISTRA macrophylla. ....	Édition
(trois plantes mères).	
CAREX variegata. ....	3—5
CHELIDONIUM japonicum. ....	5
FUNKIA, un assortim. de 10 espèces	6
HEMEROCALLIS Thunbergii. ....	10
HOJA carnosa picta. ....	4—6
rotundifolia. ....	2—3
variegata. ....	4—6
IRIS Kaempferi. ....	3
LAPPA edulis, les six. ....	4
LAPATHUM Madaiwô. ....	3
(remède purgatif et stomachique).	
LIGULARIA gigantea. ....	2
cristata. ....	5—10
Kaempferi. ....	4—8
LILIUM Coridion. ....	30
Partheneion	
speciosum album. ....	1—2
latifolium. ....	3—5
punctatum. ....	3—5
rubrum, verum. ....	2—2
roseum. ....	3
purpureum	
japonicum Takesima. ....	8—14
Thunbergianum grandiflor.	5—15
tigrinum, jap. p. douzaine	6
SARANA camtschatica (lis noir) ..	15
LYSIMACHIA japon. pl. pendant. ..	1
ORNITHOCROTALUM japonicum. ....	2—5
POLYGONUM Sieboldii, p. douz. ..	3
PARDANTHUS chinensis, var. jap. ..	1
RHODEA japonica marginata. ....	3
macrophylla auro-striata. Édition	
(trois plantes mères).	
ROXBURGHIA phyllantha, officinel.	3

#### Ignames du Japon.

DIOSCOREA opposita.	
Un tronçon de racines. ....	1
Six " " " " " " " " " " " "	4
La douzaine. ....	6
L'IGNAME DU JAPON est bien	











## Plantes du Japon.

Les arbres et les arbrisseaux américains introduits en Europe au siècle passé ont changé favorablement l'aspect de nos jardins, de nos parcs et de nos promenades. De même les plantes japonaises importées par nous dans les Pays-Bas en 1830 se sont répandues rapidement dans nos serres froides, nos jardins d'hiver et nos parterres, grâce à leur domesticité antique, leur acclimatation et leur culture facile. Encouragé par ces succès heureux, nous avons continué d'introduire des plantes d'ornement, usuelles et médicales du Japon, et favorisé par le Gouvernement des Indes-Orientales Néerlandaises nous avons réussi d'importer en Europe plusieurs centaines de végétaux de la Flore de cet empire limitrophe des deux mondes et de la zone torride et glaciale. Depuis 25 ans nos plantes japonaises sont entrées pour ainsi dire, en rapport social avec les botanophiles européens; il n'y a presque de fenêtre, de jardin d'hiver qui n'en soit décoré; dans les parterres elles sont devenues indigènes. Qui ne connaîtrait pas nos *Lis*, nos *Funkia's*, nos *Epimèdes*; nos *Conifères*, nos *Palmiers*, nos *Pivoines* en arbre, nos *Fusains* à feuilles panachées, nos *Spirées*, *Deutzia's* et *Clématites*? Cependant plus que les plantes d'ornement du Japon ont gagné de terrain dans l'horticulture, d'autant plus nous avons dirigé nos vues et nos soins vers les plantes utiles. L'arbre à papier, à cire, à vernis, des variétés précoces du riz et du millet, les *Batates* douces et les *Ignames*, les *Gouets* et *Bardanes* mangeables et différentes plantes alimentaires et oléagineuses se trouvent déjà introduites dans notre établissement pour passer dans la grande culture de l'Europe, tandis que plusieurs plantes médicales, réputées dans leur patrie et quelques genres nouveaux et curieux y sont cultivés pour être examinés dans l'intérêt de la science par les pharmacologues et les botanistes. Nous osons même avancer que, si un jour les arbres et les arbrisseaux japonais les plus imposants par leur port, leur feuillage et leurs fleurs seront disséminés en pleine terre, si les *Paulownia's* et les *Houx* à grandes feuilles, les *Érables* rouges, les *Ormes* et les *Acacia*, les *Cryptomères*, les *Thujopsis* et les *Cephalotaxus* toujours verts — si tous ces arbres forestiers précieux, s'élèveront sur les collines et sur les pendants des montagnes, la physionomie de nos paysages sera changée par des traits caractéristiques de la Flore du Japon. Les pays de l'Europe méridionale, privées par leur antique civilisation et la culture du sol des forêts de haute futaie, ces sources permanentes de la fertilité pourraient reverdir de cette belle végétation exotique, et nous ne doutons point que notre *Chamaerops excelsa*, ce magnifique palmier à éventail, dont les frères aînés introduits par nous en Europe en 1830, surpassent déjà la hauteur de vingt à trente pieds, nos *Lauriers*, les *Chênes* à feuilles persistantes, le *Badiane* religieux, l'arbre à cire et à vernis et d'autres arbres japonais, qui résistent dans leur patrie à plusieurs degrés de froid, formeront bientôt en Italie, en Grèce et en Espagne et dans les autres pays situés sous les isothermes du Japon [où la température moyenne de l'été est de 20° R. (77° Fahr.)] des groupes d'une beauté ravissante rivales des bosquets des îles méridionales du Japon. Cependant la plus part des plantes du Japon, et surtout les arbres et arbrisseaux à feuilles toujours vertes se plaisent dans les serres froides et dans nos salons à côté de leurs anciens compatriotes les *Camellia* et *Azalea*; et transplantées au printemps en pleine terre elles y prospèrent pendant l'été et contribuent à l'ornement des jardins et à composer des groupes physiognomiques d'une flore exotique dans nos parterres. Mais c'est la vertue admirable des plantes japonaises, de se prêter avec tant de facilité à la culture forcée, qui leur donne un mérite réel, qui les fait apprécier par les horticulteurs, et qui les rend indispensables pour les expositions des fleurs et dans nos jardins d'hiver.



## Arbres et arbrisseaux.

Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.			
			A	B	C	D
						25
<i>Acacia Nemu Willd.</i> . . . . .	c	Pl. d'ornem.				
<b>**Acer japonicum Thbg.</b> fol. atrosanquin. . . . . (à Mr. L. van Houtte.)	c	id.				
— <b>**polymorphum S. et Z.</b> . . . . . (à Mr. L. van Houtte.)	c	id.				
<i>Akebia quinata Decais.</i> . . . . .	c	Pl. grimpante.		2	5	
<b>*Ampelopsis heterophylla S. et Z. (1855)</b> . . . . .	c	id.				
— <i>heterophylla fol. pict.</i> . . . . .	c	id.		1	2	
<b>**Aralia japonica Thbg.</b> . . . . . (à Mr. E. G. Henderson.)	b	Pl. d'ornem.				
— <i>canescens Sieb. et Zucc.</i> . . . . .	b	id.		2	3	
— <b>*mitsu Sieb.</b> . . . . .	b	id.				
— <b>*pentaphylla Thbg.</b> . . . . .	b	id.	5			
<i>Ardisia crenulata Vent.</i> . . . . .	b	id.		2		
— <b>*crispa D.C.</b> . . . . . (à Mr. E. G. Henderson.)	b	id.				
— — <i>bacc. albis.</i> . . . . . (à Mr. v. Houtte.)	b	id.				
— — <b>*Manrjô, Sieb. baccis flavis</b> . . . . .	b	id.				
— — — <b>*baccis rubris</b> . . . . .	b	id.				
— <i>japonica D.C.</i> . . . . .	b	id.		1		
<i>Aristolochia Kaempferi Willd.</i> . . . . .	c	Pl. grimpante.		1	2	
<i>Armeniaca Mume S. et Z. praecocissima.</i> <sup>1)</sup> . . . . .	c	Pl. à fruit.				25

A. Boutures, seulement livrées des plantes les plus rares.

B. Plantes fortes, de 10 à 25 Centimètres.

C. Plantes très fortes, de 50 à 150 Centim.

D. Plantes uniques ou plantes-mères importées du Japon.

a. serre chaude. b. serre froide. c. pleine terre.

\* Plantes nouvelles qui paraissent la première fois sur nos catalogues.

\*\* Pl. vendues en totalité; les noms des acquéreurs seront portés durant deux ans sur nos catalogues.

Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont peu multipliées; on indiquera la force et les prix des sujets disponibles aux personnes qui en demanderont.

Les envois seront faits par la voie la plus directe et la plus prompte, à moins qu'il ne soit indiqué un moyen particulier de transport. — Les frais d'emballage et d'expédition, les risques et périls sont pour le compte des acheteurs. — Les prix sont marqués en francs. — Les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relations suivies, sont priées d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter ou de joindre à leur ordre un mandat.

Les demandes concernant les plantes offertes dans notre Catalogue doivent être faites avant le 1<sup>er</sup> Mai où la livraison aura lieu. Les plantes rares ou peu multipliées seront cédées aux amateurs d'après un calcul basé sur la date de leurs commandes et la distance de leur domicile. — On peut se procurer aussi de très forts individus dans les plantes Japonaises, et des renseignements sur toute espèce introduite en Europe. — Dans notre établissement il ne se vendent des plantes au-dessous d'un franc.

1) Les fleurs précoces et abondantes de couleur rose pâle réservent à cet abricotier une place distinguée dans les serres froides et les parterres. Ses fruits, dont la chair est dure et consistante sont très propres pour être confis ou salés. Les abricots salés, connus sous le nom de *Mumebosi*, sont très recherchés au Japon et exportés en Chine et même aux Indes-Orientales.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force			
			A	B	C	D
<i>Armeniaca pendula</i> Sieb. <sup>1)</sup> . . . . .	fr. c	Pl. d'ornem.				
— <i>virgata</i> Sieb. . . . .	c	id.				
** <i>Aucuba japonica</i> Thbg. fol. immaculatis . . . . .	c	id.				
(à Mr. Henderson.)						
— — fol. maculat. . . . .	c	id.		1	2	
— — — — var. nov. . . . .	c	id.				
— — late maculata Hort. . . . .	c	id.		2		
<i>Bambusa aurea</i> Sieb. . . . .	b	id.		5		
— <i>nigra</i> Lodd. . . . .	b	id.		6		
<i>Boehmeria frutescens</i> Thbg. <sup>1</sup> . . . . .	b	Pl. botanigue.		1	2	
<i>Broussonetia Kaempferi</i> Sieb. . . . .	c	arb. à papier.		1	2	
— <i>Kazinoki</i> Sieb. . . . .	c	id.		2	4	
<i>Buddleia Lindleyana</i> Fort. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1		
<i>Buxus sinensis</i> Hort. . . . .	c	id.		5		
<i>Callicarpa gracilis</i> S. et Z. . . . .	b	id.		1	2	
— <i>japonica</i> Thbg. . . . .	b	id.		1	2	
— <i>Murasaki</i> Sieb. . . . .	b	id.		1	2	
<i>Camellia japonica</i> flor. simpl. . . . .	b	id.		8		
— — * <i>Ida</i> . . . . .	b	id.		6		
— — * <i>Princesse Amélie</i> . . . . .	b	id.		15		
— — * <i>Sasanqua</i> Thbg. Batava. . . . .	b	id.		15		
<i>Camphora officinalis</i> Nees. . . . .	b	Pl. médical.		5		
— — var. Jap. . . . .	b	id.				
<i>Catalpa Kaempferi</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. d'ornem.				
<i>Cercis chinensis</i> Bge. Var. jap. . . . .	c	id.		4		
<i>Celastrus punctatus</i> Thbg. . . . .	b	Pl. grimpante.		2		
— <i>Orixa</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. médical.		3		
<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl. flor. rub. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	2	
— — flor. roseo-alb. . . . .	c	id.		2		
— — umbilicata Sieb. et de Vries <sup>2)</sup> . . . . .	c	Pl. à fruit.		1	3	
<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl. Var. jap. . . . .	b	Pl. d'ornem.	5			
<i>Cinnamomum Loureiri</i> Nees . . . . .	b	Pl. médical.	5			
— <i>dulce</i> Nees . . . . .	b	id.	5			
— <i>pedunculatum</i> Nees . . . . .	b	Pl. d'or. et méd.				15
— * <i>daphnoides</i> S. et Z. . . . .	b	id.				
<i>Clematis florida</i> Thbg. flor. alb. simpl. . . . .	c	Pl. d'orn. grim.		1		
— — flor. pleno . . . . .	c	id.		1		
— — Tessen . . . . .	c	id.		2		
— — Sieboldii Don. . . . .	c	id.		2	3	
— patens Morr. var. azurea . . . . .	c	id.		1	2	
— — ** <i>Amalia</i> . . . . .	c	id.				
(à M. v. Houtte.)						
— — * <i>flore pleno</i> . . . . .	c	id.				
— — * <i>Anna</i> . . . . .	c	id.				
— — <i>Helena</i> . . . . .	c	id.		1	2	
— — * <i>Ida</i> . . . . .	c	id.				
— — ** <i>Louisa</i> . . . . .	c	id.				
(à M. v. Houtte.)						

1) Les fruits de cette nouvelle variété du coignassier du Japon sont d'un parfum de violettes, et l'arôme qu'ils acquièrent par l'art du confiseur surpasse celui de tous les fruits de nos jardins.

2) Cet abricotier mérite pleinement cet épithète; ses branches garnies de fleurs blanches et rougeâtres tombent presque perpendiculairement jusqu'à toucher la terre.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la forec.			
			A	B	C	D
<i>Clematis patens</i> Sophia . . . . .	fr. c	Pl. d'orn. grim.		1	2	
— — — *flore pleno . . . . .	c	id.				
— — — monstrosa . . . . .	c	id.		2	4	
— — — *purpurascens . . . . .	c	id.				
— — — *rosea . . . . .	c	id.				
— tubulosa Turcz. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1		
<i>Clerodendron Kaempferi</i> Willd. . . . .	a	id.		6		
— fragrans Willd. . . . .	b	id.		2		
— trichotomum Thbg. . . . .	b	id.		5		
<i>Cocculus japonicus</i> D.C. . . . .	c	id.		1	2	
* <i>Corylopsis spicata</i> S. et Z. . . . .	c	id.				
<i>Daphne odora</i> Thbg. . . . .	b	id.		2		
— — fol. marg. . . . .	b	id.		3		
— — flor. rubr. . . . .	b	id.		3		
* <i>Desmodium racemosum</i> D.C. . . . .	b	id.				
<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc. . . . .	c	id.		1	2	
— gracilis S. et Z. . . . .	c	id.		1	2	
* <i>Diervilla</i> (Weigela) <i>hortensis</i> S. et Z. flor. rubr. . . . .	e	id.				
— — amabilis Hortor. . . . .	c	id.		2	5	
— — rosea Hortor. . . . .	c	id.		1	2	
<i>Elaeagnus pungens</i> Thbg. . . . .	b	id.		1	2	
<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. . . . .	b	Pl. à fruit.			15	
<i>Evonymus alatus</i> Sieb. . . . .	c	Pl. d'ornem.		5	10	
— japonicus Thbg. . . . .	b	id.		1	2	5
— — angustifolius . . . . .	b	id.		1		
— — fol. argenteo-varieg. . . . .	b	id.		1	2	
— — fol. auro-varieg. . . . .	b	id.		2	4	
— — fol. crispis . . . . .	b	id.		2	4	
* <i>Fagara</i> (zanthoxylon) <i>piperita</i> Thbg. <sup>1)</sup> . . . . .	b	Pl. usuelle.		5	10	
<i>Ficus erecta</i> Thbg. . . . .	b	Pl. d'ornem.		3		
— — fol. laciniat. . . . .	b	id.		5		
— japonica Bl. . . . .	b	id.		5		
— stipulata Thbg. . . . .	b	Pl. grimpante.		1		
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl. . . . .	c	id.		1	2	
<i>Gardenia florida</i> Lin. . . . .	a	Pl. d'ornem.		2		
— radicans Thbg. . . . .	b	id.		3		
<i>Galloa trinervis</i> Hort. Bog. . . . .	b	id.		3	6	
<i>Helwingia rusciflora</i> Willd. . . . .	c	Pl. botanique.		2	3	
<i>Hibiscus Hamabo</i> S. et Z. . . . .	b	Pl. d'ornem.		5		
— mutabilis Lin. grandiflorus . . . . .	b	id.		5		
— — pygmaeus . . . . .	b	id.		5		
— syriacus Lin. var. jap. . . . .	b	id.		5		
<i>Hydrangea Asisai</i> Sieb. (japonica) . . . . .	c	id.		1	2	
— — variegata . . . . .	c	id.	5			
— Hortensia . . . . .	c	id.		1		
— involucrata S. et Z. . . . .	b	id.	5			
— *paniculata S. et Z. . . . .	b	id.				
<i>Ilex latifolia</i> Thbg. . . . .	b	Pl. d'ornem.		2	6	
— — var. Torajo . . . . .	b	id.		2	6	
<i>Illicium religiosum</i> S. et Z. . . . .	b	Pl. d'orn. méd.		4	8	
* <i>Indigofera Iwafusi</i> Sieb. . . . .	c	Pl. d'ornem.	5	10	25	
<i>Jasminum floridum</i> Bge. . . . .	b	id.		1	2	

1) Les feuilles et les fruits remplacent au Japon le poivre.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.			
			A	B	C	D
	fr.					
<i>Jasminum nudiflorum</i> . . . . .	c	Pl. d'orn. méd.		1		
<i>Kadsura japonica</i> D.C. <sup>1)</sup> . . . . .	b	Pl. gr. et méd.		2		
<i>Kerria japonica</i> D.C. flor. simpl. . . . .	c	Pl. d'orn. et us			2	
— — flor. pleno. . . . .	c	id.			1	
* <i>Koelreuteria paniculata</i> Larm. var. Jap. . . . .	c	Pl. d'ornem.				25
<i>Ligustrum japonicum</i> Thbg. . . . .	b	id.		2		
— * <i>Ibota</i> Sieb. <sup>2)</sup> . . . . .	c			3		
— <i>lucidum</i> Ait. . . . .	b			2		
— <i>ovalifolium</i> Hassk. . . . .	c			1	2	
* <i>Lespedeza argyracea</i> S. et Z. . . . .	b	id.		2		
<i>Litsaea glauca</i> Thbg. bacc. rubr. . . . .	b	Pl. d'ornem.				50
— — bacc. flav. . . . .	c	id.			25	
<i>Lonicera brachipoda</i> D.C. var. repens. . . . .	c	Pl. gr. et méd.		1	2	
— <i>chinensis</i> Wats. . . . .	b	Pl. grimpante.		1		
— <i>confusa</i> D.C. . . . .	b	id.		1		
<i>Lycium Trewianum</i> R. et S. . . . .	b	Pl. grimpante		1		
* <i>Machilus Thunbergii</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. d'ornem.			25	
* <i>Marlea platanifolia</i> S. et Z. . . . .	b	id.	10			
<i>Melia japonica</i> Hort. Bog. . . . .	c	id.	20			
<i>Morus Tôkwa</i> Sieb. . . . .	b	Pl. usuelle.		1	2	
<i>Musa chinensis</i> Sweet. . . . .	b	Pl. d'orn et us.			10	
* <i>Nandina domestica</i> Thbg. var. major. . . . .	a	Pl. d'ornem.		1		
— — var. minor. . . . .	b	id.		5		
<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. jap. . . . .	b	Pl. d'ornem.	10			
— — flor. rubr. . . . .	b	id.		15		
<i>Paederia foetida</i> Lin. . . . .	c	Pl. grimpante.		1		
<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. d'or. et for		1	2	
<i>Philadelphus satsumanus</i> Sieb. . . . .	b	Pl. d'ornem.		1	2	
<i>Pittosporum Tobira</i> Ait. . . . .	b	id.		2	5	
— <i>sinense</i> Don. fol. varieg. . . . .	c	id.		8	6	
* <i>Persica vulgaris</i> Ris. var. jap. . . . .	c	Pl. à fruit.				
— — * <i>flor. pleno albo roseo</i> . . . . .	c	Pl. d'ornem.			15	
<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z. . . . .	b	Pl. d'ornem.		1	3	
<i>Platycaarya</i> (Fortunea) <i>strobilacea</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. d'or. et bot.	10			
<i>Prunus japonica</i> Thbg. flor. simpl. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1		
— — flor. pleno roseo . . . . .	c	id.		2		
— — — — albo . . . . .	c	id.				
* <i>Punica granatum</i> Lin. flor. pl. puniceo-alb. var. . . . .	b	Pl. d'ornem.				50
* <i>Malus spectabilis</i> Desf. var. Jap. Kaido . . . . .	c	Pl. d'ornem.		5		
— <i>Toringo</i> Sieb. <sup>3)</sup> . . . . .	c	Pl. d'or. et à fr.		5		
— <i>floribunda</i> Sieb. . . . .	c	id.		10		
— <i>Ringo</i> Sieb. . . . .	c	id.		10		
* <i>Quercus acuta</i> Thbg. . . . .	b	Pl. d'ornem.				
— <i>glabra</i> Thbg. <sup>4)</sup> . . . . .	b	Pl. d'or. et à fr.		10	15	
* <i>Raphirolepis japonica</i> S. et Z. . . . .	b	Pl. d'ornem.				
<i>Rhus Osbeckii</i> var. jap. <sup>5)</sup> c. sem. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	2	

2) C'est un remède renommé chez les indigènes pour fortifier les cheveux.

2) La véritable espèce de Troène sur lequel vit l'insect à ciré (*Asiraca cerasifera*) observé par Macartney en Chine et par nous au Japon.

3) Ce pommier nain et les deux suivants sont très propres à être forcés à cause de leur précocité et de l'abondance des fleurs.

4) Les glands de ce chêne d'un goût de nos châtaignes sont très estimés.

5) On trouve sur les feuilles de ce Sumac une espèce de galles préférables à celles importées du Levant.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.			
			A	B	C	D
	fr.					
*Rhus Succedanea Lin. e sem. 1853 . . . . .	b	arbre à cire.		25		
— *vernicifera D.C. vera e sem. 1853 . . . . .	b	— à vernis.		30		
*Rottlera japonica Spreng. 1854 . . . . .	b	Pl. d'ornem.		10		
*Rosa Camellia Sieb. <sup>1)</sup> . . . . .	c	id.		10	25	
— Iwara Sieb. . . . .	c	id.		1	2	
— *rugosa Thbg. flor. pleno . . . . .	c	id.		2	5	
— *hystrix Lindl. . . . .	c	id.	5			
*Rubus triphyllus Thbg. flor. purpur. . . . .	b	id.	5			
Salix Sieboldiana Bl. . . . .	c	id.		1	2	
Sapindus Mukurosi Gärt. . . . .	b	arbre à savon.				30
Smilax China Lin. var. Jap. . . . .	b	Pl. d'ornem.		5		
Skimmia japonica Thbg. . . . .	b	id.		25		
Sophora japonica Lin. . . . .	c	Pl. d'o. et méd.		2		
— — pendula . . . . .	c	id.		4		
Spiraea Blumei. Hookl. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	2	
— callosa Thbg. . . . .	c	id.		1	2	
— prunifolia S. et Z. . . . .	c	id.		1	2	
— Reevesii Lindl. . . . .	c	id.		1	2	
— — flor. pleno . . . . .	c	id.		2		
— *rupestris Sieb. . . . .	c	id.		2	4	
Tamarix chinensis Lour. . . . .	c	id.		2	5	
*Tecoma Thunbergii Sieb. <sup>2)</sup> . . . . .	c	Pl. grimpante.		3	5	
Ternstroemia japonica S. et Z. . . . .	b	Pl. d'ornem.		2	10	15
Tetranthera japonica Spreng. . . . .	b	id.		10	15	
*Ulmus Kejaki Sieb. <sup>3)</sup> . . . . .	c	Pl. forestiere.		5	15	
Viburnum Awabuki Sieb. . . . .	b	Pl. d'ornem.		1	3	
— plicatum Thbg. . . . .	b	id.	6			
Vitex canabifolia S. et Z. . . . .	b	id.		2		
*Vitis Thunbergii S. et Z. . . . .	b	Pl. grimpante.				
Wisteria (Glycine) sinensis D.C. flor. albo . . . . .	c	id.				
— *sinensis var. Jap. macrobotrys Sieb. . . . .	c	id.				
— *japonica S. et Z. . . . .	c	id.				
— brachybotrys S. et Z. (non hortorum) . . . . .	c	id.				
— multijuga Sieb. . . . .	c	id.				
Conifères du Japon.						
Cephalotaxus drupacea S. et Z. . . . .	c			5	10	
— — à tête . . . . .				15	25	50
— pedunculata S. et Z. . . . .	c			5	10	
— — à tête . . . . .				15	25	60
Cryptomeria japonica Don. . . . .	c			2	5	20
— — Lobii Hort. . . . .				5	10	
— — nana Hort. . . . .				5	10	
Cunninghamia sinensis Rich. . . . .					15	
Juniperus japonica Sieb. . . . .	c			2	5	10
— procumbens Sieb. . . . .	c			2	5	10
*Pinus Massoniana Lamb. (vera e sem.) 1852 . . . . .	c			30		
— *densiflora S. et Z. e sem. 1852 . . . . .	c			25		
Podocarpus macrophylla Walh. . . . .	b			5	25	
— Maki Sieb. . . . .	b			5	30	

- 1) Espèce distinguée de tous les rosiers connus par les feuilles à 3 folioles.
- 2) C'est la vraie *Bignonia grandiflora* découverte et décrite par Thunberg.
- 3) Cet Orme est l'arbre qui fournit le bois le plus précieux et estimé au Japon.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.			
			A	B	C	D
Podocarpus Coraïana Sieb. . . . .	fr.			3	10	
— Nageja S. et Z. . . . .	b			10		
Retinospora squarrosa S. et Z. . . . .	c			5		
Salisburea adianthifolia Smth. . . . .	c			5		
Thuja pendula Lamb. . . . .	b			5	25	
*Thujopsis dolobrata S. et Z. . . . .	c					
Torreya nucifera Don. . . . .	c			5	15	
<b>Palmiers du Japon.</b>						
*Chamaerops excelsa Thbg. vera <sup>1)</sup> . . . . .	b					50
Livistonia Birô Sieb. unicum <sup>2)</sup> . . . . .	b					800
— chinensis Mart. . . . .	b					75
Phoenix farinifera Roxb. . . . .	b			25	50	
Rhapis flabelliformis Lin. var. jap. Sjurotsik Sieb. . . . .	b			10	25	
— — Kwanwon Sieb. . . . .	b			10	15	
— — aspera Sieb. . . . .	b			15	30	
Cycas revoluta Thbg. . . . .	b				50	75
— — prolifera S. et Z. . . . .	b					100

## Pivoines en arbre du Japon (*Paeonia Moutan Sims.*)

Notre magnifique collection de Pivoines en arbre, importée en 1844 du Japon dans notre Établissement, provient des jardins impériaux de Jedo et de Mijako et contient les variétés les plus distinguées de cet empire, marquées par des caractères établis dans la forme et la couleur des pétales, du périclymne, des styles et des étamines. Les plantes-mères sont greffées en approche sur des semis ou sur des pivoines sauvages du Japon, même par un procédé très perfectionné. Plantées et cultivées par nous en pleine terre, elles ont toutes fleuries. Ces pivoines sont très propres à être multipliées par la greffe; étant à fleurs simples ou semi doubles, elles se prêtent de préférence à la fécondation artificielle, afin de produire de nouvelles variétés en couleurs et à fleurs doubles. La collection originale se composait de quarante et deux variétés, dont douze qui fleurissaient les premières en 1848, sont devenues la propriété de S. A. R. le prince Frédéric des Pays-Bas. Les autres variétés qui ont fleuri plus tard et auxquelles à la 95<sup>e</sup> exposition de plantes de la société Royale d'Agriculture et de Botanique à Gand, fut décerné une médaille d'or, en dehors des concours, sont les plantes-mères dont nous présentons des assortiments. Elles se distinguent par des fleurs blanches, incarnates; lilas et de couleur de pêche; des fleurs rose changeantes; rouge-sanguines et de carmin; et par des fleurs rouges-pourprées et enivrées, striées de brun et de rouge foncé, les pétales extérieurs de quelques unes panachés de blanc et de vert. Les fleurs épanouies de plusieurs variétés ont acquis 30 à 36 centimètres de diamètre et surpassent en

1) Jeunes plantes de 50 Centim. de hauteur gagnées en 1852 de graines de la même plante-mère du jardin botanique à Dezima au Japon, qui nous a fourni les peu d'exemplaires déposées en 1830 dans les jardins botaniques à Leide, Amsterdam, Gand, Bruxelles, Bonn et à Kow, les seuls véritables pieds de *Chamaerops excelsa* en Europe.

2) Une de quatre Exemplaires importées par nous en 1830 en Europe, dont une est déposée au jardin botanique à Leide, une à Amsterdam, et une à Gand. Plante magnifique, environ de quatre mètres de hauteur.



grandeur toutes les pivoines connues. Il y en a dont les fleurs sont très odorantes. Les plantes-mères ont déjà acquis 75 à 175 Centimètres de hauteur. Mr. le professeur John Lindley qui a bien voulu en examiner les dessins faits d'après la nature, a reconnu et certifié la différence botanique de nos pivoines de celles introduites par Mr. Fortune de la Chine<sup>1)</sup>.

L'assortiment de pivoines en arbre cédé à S. A. R. le Prince Frédéric des Pays-Bas se composait de

*Variétés à fleurs blanches.*

**Princesse Sophie.**

— — **Louise.**

*à fleurs roses.*

**Reine des Pays-Bas.**

**Princesse Frédérique.**

*à fleurs roses changeantes.*

**Impératrice de Russie.**

**Princesse d'Orange.**

*à fleurs de carmin.*

**Empereur de Russie.**

**Prince d'Orange.**

*à fleurs rouge pourprée.*

**Roi des Pays-Bas.**

*à fleurs violettes.*

**Prince Alexandre.**

*à fleurs pourprées.*

**Prince Henri.**

*à fleurs couleur de cuivre.*

**Prince Frédéric.**

L'assortiment de pivoines en arbre cultivé dans notre Etablissement.		Plantes	
		Jeunes	à fleurir.
<i>Variétés à fleurs blanches.</i>			
<b>Reine Victoria</b> . . . . .	Pétales blancs; périgynion pourpré.	20	35
<b>Reine des Belges</b> . . . . .	Pétales blancs, verdâtres à l'extérieur, et une tache rose pâle à la base; périgynion blanc.	18	30
<b>Flora</b> . . . . .	Pétales blancs, ayant un reflet jaune de paille et une tache lilas pâle à la base; périgynion blanc verdâtre.	15	25
<b>Reine de Prusse</b> . . . . .	Pétales blancs, striés de pourpre avec une tache lilas; périgynion verdâtre.	15	30

1) „I have examined the drawings of the Peonies, brought to England by M. von Siebold, and I can state, that they are very fine things, for the most part are different from any thing sent to the Horticultural Society by Fortune.“  
John Lindley.



L'assortiment de pivoines en arbre cultivé dans notre Etablissement.		Plantes	
		Jeunes	à fleur.
<b>Princesse de Metternich</b> . . . . .	Pétales blancs à reflets de rose pâle à la base; périgynion couleur de pêche.	18	30
<b>Duchesse d'Orléans</b> . . . . .	Pétales blancs à reflets de jaune-paille, les extérieurs striés de vert; périgynion blanc.	18	30
<b>Nymphaea</b> . . . . .	Pétales blancs pur; périgynion blanc.	15	25
<b>Princesse de Prusse</b> . . . . .	Pétales blancs (jaunes de paille nuancés de vert avant l'épanouissement) panachés de lilas foncé à la base; périgynion jaunâtre.	18	30
<b>Princesse Amélie</b> . . . . .	Pétales blancs à reflets d'incarnat à la base; périgynion rose.	15	25
<i>à fleurs roses.</i>			
<b>Ida</b> . . . . .	Pétales roses pâles (striés de jaune paille et nuancés de vert avant l'épanouissement); périgynion rose.		4)
<b>Grand-Duchesse Hélène</b> . . . . .	Pétales roses foncées, striés de pourpre et de carmin; périgynion pourpré.	20	35
<b>Impératrice de France</b> . . . . .	Pétales d'un rose vif avec une tache pourprée à la base; périgynion pourpré. Fleurs odorantes.		
<b>Princesse Demidoff</b> . . . . .	Pétales roses pâles avec des stries plus foncées; périgynion blanc.		
<b>Madame de Cock</b> . . . . .	Pétales d'un rose jaunâtre très luisantes; périgynion incarnat. Fleurs semi-doubles.	18	30
<b>Impératrice d'Autriche</b> . . . . .	Pétales roses refletés de lilas; périgynion blanc.		
<i>à fleurs de pêche et lila.</i>			
<b>Grand-Duc de Saxe Weimar</b> . . . . .	Pétales couleur de pêche; périgynion rose.		35
<b>Alexandre de Humboldt</b> . . . . .	Pétales lilas, panachés à la base de pourpre et de carmin; périgynion pourpré.		
<i>à fleurs roses foncées et changeantes.</i>			
<b>Prince de Metternich</b> . . . . .	Pétales roses refletés de lilas; périgynion blanc.	20	35
<b>Empereur de France</b> . . . . .	Pétales roses foncées, striés de pourpre et de carmin; périgynion d'un pourpre foncé.	15	35
<b>de Vriese</b> . . . . .	Pétales roses foncées, striés de pourpre et de carmin; périgynion blanc.		
<i>à fleurs rouges foncées, de carmin et de pourpre.</i>			
<b>Roi de Wurtemberg</b> . . . . .	Pétales rouges-pourprés; périgynion pourpré.	18	30



L'assortiment de pivoines en arbre cultivé dans notre Etablissement.		Plantes	
		Jeunes	à fleurir.
<b>von Siebold</b> . . . . .	Pétales d'un rouge carmin striés de pourpre; périgynion rouge foncé. Fleurs semi-doubles.		
<b>Baron de Muegel</b> . . . . .	Pétales de carmin, striés de pourpre; périgynion cramoisi. Fleurs semi-doubles.	15	25
<b>Roi de Prusse</b> . . . . .	Pétales d'un carmin pourpré; périgynion pourpré.	21	25
<b>Empereur d'Autriche</b> . . . . .	Pétales d'un rouge foncé; périgynion pourpré. Les feuilles en prin- temps sanguines.	18	30
<b>Roi des Belges</b> . . . . .	Pétales cramoisis foncés à reflets de pourpre; périgynion de carmin.		
<b>Prince de Prusse</b> . . . . .	Pétales d'un rouge de pourpre, striés de blanc.		
<b>John Lindley</b> . . . . .	Pétales rouges foncés. Feuilles panachées de rouge. <i>à fleurs brun-rouges, très foncées.</i>		50
<b>Prince Albert</b> . . . . .	Pétales brun-rouges très foncés, les extérieures, quelquefois panachés de blanc et de vert; périgynion pourpré. <i>à fleurs d'un rouge pourpré et panachées.</i>		
<b>Empereur Alexandre II.</b> . . . . .	Pétales d'un rouge pourpré panachés de blanc et de lilas; périgy- nion pourpré.	50	100
Un assortiment de jeunes plantes de douze variétés avec noms, nuancées d'après notre choix. . . . .		150	
Un assortiment de six variétés : . . . . .		60	
Les amateurs sont priés de nous honorer de leurs commandes aussitôt possible, comme le nombre des plantes disponibles est très borné.			
<b>Paeonia Moutan Germania.</b>			
Cette pivoine en arbre sauvage sur laquelle sont greffé les va- riétés gagnées par la culture, est d'un grand mérite concernant la cou- leur et le parfum de ses fleurs, et d'une haute importance pour l'hor- ticulture à cause de sa multiplication facile par la division du pied, et de sa rusticité, ayant passé plusieurs hivers en pleine terre sans aucun abri. Sa couleur est d'un cramoisi vif, les pétales sont garnis d'une tache noire à la base et les étamines sont terminées par des anthères dorées.			
Un bel exemplaire à fleurir . . . . .		5	
Une jeune plante . . . . .		2	
La douzaine de plantes à fleurir formant une groupe . . . . .		40	
La douzaine de jeunes plantes . . . . .		15	



Plantes vivaces à fleurs de pleine terre et de serres froides.

Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.		
			A <sup>2</sup>	B	C
<i>Aceranthus diphyllus</i> Morr. et Decais. . . . .	fr. c	Pl. botanique.		1	
<i>Aconitum chinense</i> Sieb. . . . .	o	Pl. médical.		1	
— <i>autumnale</i> Lindl. . . . .	c	id.		1	
<i>Acorus gramineus</i> Ait. <sup>2)</sup> . . . . .	b	Pl. d'or. et méd.		1	2
— — fol. argent. striat. . . . .	b	id.		1	
— <i>minimus</i> Sieb. . . . .	b	id.		2	
— <i>pusillus</i> Sieb. . . . .	b	id.		2	
* <i>Ajuga decumbens</i> Thbg. . . . .	c	Pl. botanique.		1	
<i>Aloë chinensis</i> Haw. var. Jap. . . . .	b	Pl. d'ornem.		5	
<i>Amaryllis</i> (Lycoris) <i>aurea</i> L'Hér. var. Jap. . . . .	b	id.		5	
— — <i>radiata</i> Ait. . . . .	c	id.		3	
<i>Anemone japonica</i> S. et Z. . . . .	o	id.			1
<i>Arisaema ringens</i> Schott. . . . .	b	id.			
— * <i>Sieboldii de Vries</i> . . . . .	b	id.	5		
— — * <i>praecox</i> Sieb. . . . .	b	id.	5	25	
— * <i>japonicum</i> Bl. . . . .	b	id.	10	5	
— * <i>Konjak</i> Sieb. <sup>4)</sup> . . . . .	c	Pl. usuelle.	5	10	
— — var. . . . .	c	id.			
* <i>Artemisia Moxa</i> D.C. . . . .	c	Pl. médical.		1	
— — *var. . . . .	c	id.		1	
<i>Asparagus japonicus</i> Thbg. . . . .	o	id.		1	
— <i>daicis</i> Sieb. <sup>5)</sup> . . . . .	o	id.		1	
* <i>Aspidium Sieboldii</i> Hort. . . . .	b	Fougère.		12	15
<i>Aspidistra elatior</i> Morr. et Decais. . . . .	b	Pl. d'ornem.		2	
— — fol. varieg. . . . .	b	id.		2	
— — * <i>angustifolia</i> (1855) . . . . .	q	id.			
— — * <i>macrophylla</i> (1855) . . . . .	b	id.			
— — * <i>punctata</i> (1855) . . . . .	b	id.			
<i>Aster Fortunei</i> Lindl. . . . .	c	id.		1	
<i>Barnardia scilloides</i> Lindl. . . . .	c	id.		1	
<i>Bletia hyacinthina</i> R. Br. var. <i>Nagiran</i> Sieb. . . . .	b	Orchidée.		2	
* <i>Boehmeria macrophylla</i> S. et Z. . . . .	b	Pl. d'ornem.		2	
<i>Calanthe bicolor</i> Lindl. . . . .	b	Orchidée.	5		
— <i>ochracea</i> Sieb. . . . .	b	id.	5		
<i>Calystegia pubescens</i> Lindl. . . . .	c	Pl. grimpante.		1	
* <i>Campanumoea lanceolata</i> S. et Z. . . . .	b	id.			
(à Mr. L. van Houtte.)					
* <i>Carox variegata</i> Sieb. et de Vries. . . . .	o	Pl. d'ornem.		5	
* <i>Chelidonium japonicum</i> Thbg. . . . .	c	id.	5	10	
<i>Chloranthus inconspicuus</i> Schurz. . . . .	b	id.	3		
<i>Crinum maritimum</i> Sieb. . . . .	b	id.			5
<i>Cyrtonium falcatum</i> Hort. . . . .	b	Fougère.		3	

1) a. serre chaude. b. serre froide. c. pleine terre.

2) A jeunes plantes. B fortes à fleurir. C très fortes.

3) Les espèces naines d'*Acorus* odorant, surtout la variété panachée, sont très propres pour border les bassins dans les jardins d'hiver.

4) Des tubercules de cette Aroidée on retire l'amydon pour en préparer une gélatine fort nutritive. C'est un mets national qui s'appelle *Konjak*.

5) Les racines tuberculeuses sont mangées cuites et confites.

6) Plante printanière à grandes fleurs d'un jaune d'or.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.		
			A	B	C
	fr.				
* <i>Disporum sessile</i> Don. . . . .	c	Pl. d'ornem.			
— — * <i>foliis variegat.</i> . . . . .	c	id.			
** <i>Dracaena maculata</i> (Sieboldii) . . . . .	a	id.			
(à Mr. L. van Houtte.)					
* <i>Epimedium Ikariso</i> Sieb. . . . .	c	id.			
— <i>sinense</i> Sieb. . . . .	c	id.			
— <i>macranthum</i> Morr. et Decais. . . . .	c	id.		1	
— <i>Musschianum</i> Morr. et Decais. . . . .	c	id.		1	
— <i>violaceum</i> Morr. et Decais. . . . .	c	id.		1	
<i>Eucapnos</i> (Dielytra) <i>spectabilis</i> S. et Z. . . . .	c	id.	1	2	
<i>Funkia cucullata</i> Sieb. . . . .	c	id.		1	
— <i>lanceolata</i> Sieb. . . . .	c	id.		1	
— <i>maculata</i> Sieb. . . . .	c	id.		1	
— <i>marginata</i> Sieb. . . . .	c	id.		1	
— <i>ovata</i> Spreng. . . . .	c	id.		1	
— — <i>fol. aureo-maculat.</i> . . . . .	c	id.	1	2	
— <i>Sieboldiana</i> Lod. . . . .	c	id.	1	2	
— <i>spatulata</i> Sieb. <i>fol. albo-marg.</i> . . . . .	c	id.		1	
— <i>subcordata</i> Spreng. . . . .	c	id.		1	
— — <i>β. grandiflora</i> . . . . .	c	id.	1	2	
— <i>undulata</i> Sieb. . . . .	c	id.	1		
— * <i>sinensis</i> Sieb. . . . .	c	id.			
<i>Geranium Thunbergii</i> S. et Z. . . . .	c	Pl. botanique		1	
* <i>Hemerocallis disticha</i> Don. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	
— <i>Thunbergii</i> Sieb. . . . .	c	id.			
— — <i>foliis variegat.</i> . . . . .	c	id.			
— <i>Sieboldii</i> Kiks. . . . .	c	id.		1	2
— <i>fulva</i> Linn. . . . .	c	id.			2
— — <i>fol. variegat.</i> . . . . .	c	id.			1
<i>Heterotropa asaroides</i> Morr. et Decais. . . . .	c	Pl. bot. et méd.	1		
— — * <i>varietas</i> . . . . .	c	id.			
* <i>Hoya carnosa</i> R. Br. var. <i>Jap. Motoskei</i> T. et B. . . . .	a	Pl. d'ornem.			
— — ** <i>pieta</i> Sieb. . . . .	a	id.			
(à Mr. Jongeling et Winter.)					
— — <i>rotundifolia</i> Sieb. . . . .	a	id.	2	5	
— — ** <i>variegata</i> Sieb. . . . .	a	id.			
(à Mr. Jongeling et Winter.)					
<i>Hoteia japonica</i> Morr. et Decais. . . . .	c	id.			1
— * <i>Sjoma</i> Sieb. . . . .	c	id.			
<i>Houttuynia cordata</i> Thbg. . . . .	b	Pl. médical.		1	
* <i>Iris Kaempferi</i> Sieb. . . . .	c	Pl. d'ornem.	5		
— <i>japonica</i> Thbg. . . . .	c			1	
* <i>Lappa edulis</i> Sieb. 1) . . . . .	c			1	
* <i>Lapathum Madaiwô</i> Sieb. . . . .	c	Pl. médic.			
* <i>Ligularia cristata</i> Sieb. . . . .	b	Pl. d'ornem.	5	10	
— <i>gigantea</i> S. et Z. . . . .	b	id.		2	
— * <i>Kaempferi</i> S. et Z. . . . .	b	id.	5	8	
* <i>Liparis nebulosa</i> Bl. . . . .	b	Orchidée.	10		
<i>Lychnis grandiflora</i> Jacq. . . . .	c	Pl. d'ornem.			
** — — <i>Sieboldii</i> Houtt. . . . .	c	id.			
(à Mr. van Houtte.)					

1) C'est une des plantes potagères les plus estimées au Japon; on en mange les racines comme chez nous les scorsonères.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la forêt.		
			A	B	C
					fr.
<i>Lygodium japonicum</i> Hort. Amst. . . . .	b	Fougère.	2		
<i>Lysimachia japonica</i> Thbg. . . . .	c	Pl. penlante	2		
<i>Marsdenia tomentosa</i> Morr. et Decais. . . . .	b	Pl. grimpe.	1		
<i>Narcissus Tazetta</i> Linn. var. jap. . . . .	c			5	
<i>Nipholobus Lingua</i> Spreng. . . . .	b	Fougère.	2		
<i>Onichium japonicum</i> Hort. . . . .	b	id.			
<i>Ophiopogon Jaburan</i> Sieb. . . . .	c	Pl. d'ornem.		2	
— <i>japonicus</i> Kerr. . . . .	c	Pl. d'orn. mod.		1	
— <i>spicatus</i> Kerr. . . . .	c	Pl. d'ornem.		2	
<i>Opuntia Saboten</i> Sieb. . . . .	b	id.		5	
* <i>Ornithoecrotalum japonicum</i> S. et de Vries. . . . .	c	id.	2	5	
— — <i>foliis aurovariegat.</i> . . . .	c				
* <i>Phajus maculatus</i> Lindl. . . . .	b	Orchidée.			
— <i>minor</i> Bl. . . . .	b	id.			
<i>Polygonatum japonicum</i> Morr. et Decais. <sup>1)</sup> . . . . .	c	Pl. d'orn. et us.		1	
— <i>Thunbergii</i> Morr. et Decais. . . . .					
— — <i>*foliis margin.</i> . . . .					
* <i>Paeonia albiflora</i> Pallas. fl. alb. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	
— — la douzaine de différentes variétés . . . . .		id.		6	
<i>Pardanthus chinensis</i> Kerr. var. jap. . . . .	c	id.		1	
<i>Polygonum filiforme</i> Thbg. . . . .	c	id.		1	
— <i>pictum</i> Sieb. . . . .	c	id.		1	
— <i>Sieboldii</i> Reinw. <sup>2)</sup> . . . . .	c	Pl. d'or. et flor.			1
— — la douzaine . . . . .					3
— — le cent. . . . .					25
<i>Rhodea japonica</i> Roth. . . . .	b	Pl. d'ornem.		2	
— — <i>variegata</i> . . . . .	b	id.		3	
— — <i>marginata</i> . . . . .	b	id.	5		
— — <i>minor</i> . . . . .	b	id.	2		
— — <i>*macrophylla</i> . . . . .	b	id.			
<i>Roxburghia phyllantha</i> S. et Z. var. officinalis . . . . .	b	Pl. bot. et méd.	5		
<i>Rupifraga sarmentosa</i> Thbg. . . . .	c	Pl. d'or. et pen.			1
— <i>minor</i> . . . . .	c				1
<i>Scutellaria japonica</i> Morr. et Decais. . . . .	c	Pl. d'ornem.		1	
<i>Sedum Sieboldii</i> Sweet. . . . .	c	Pl. pendante.		1	
<i>Splitgerberia japonica</i> Micq. . . . .	b	Pl. d'ornem.		1	
<i>Thermopsis fabacea</i> D.C. var. jap. . . . .	c	id.		1	
<i>Tradescantia discolor</i> Smth. var. elatior . . . . .	a	id.		10	
<i>Urtica nivea</i> Linn. . . . .	b	Pl. usuelle.		2	
<i>Viola Patrinii</i> D.C. . . . .	c	Pl. botanique.		2	
<i>Vincetoxicum atratum</i> Bge. . . . .	c	Pl. d'ornem.		2	
— <i>japonicum</i> Morr. et Decais. <i>a</i> <i>flavescens</i> . . . . .	c	Pl. grimpante.		1	

1) Les racines sont mangées comme chez nous les Asperges.

2) Cette Renouée est une de nos introductions les plus importantes du Japon, une plante d'ornement vivace, inextirpable, d'un feuillage luisant et des fleurs en grappe très gracieuses, par laquelle on peut improviser des bosquets, abriter les jeunes plantations et fortifier les collines sablonneuses et les dunes. L'herbe qu'on peut faucher en printemps à plusieurs reprises fournit un fourrage excellent pour l'engraissement des bestiaux qui la mangent de préférence; les fleurs, qui paraissent en automne, sont très mielleuses et donnent aux abeilles leur provision d'hiver; la racine amère et tonique est un médicament réputé chez les Chinois et les Japonais; enfin les tiges même qui meurent en hiver sont bonnes à brûler et pour en faire des allumettes.



Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force.		
			A	B	C
	fr.				
<i>Vincetoxicum japonicum</i> $\beta$ lilaceum . . . . .	c	Pl. grimpante.		1	
— — — — $\gamma$ purpurascens . . . . .	c	id.			
— — — — $\delta$ versicolor . . . . .	c	id.			
— — — — $\epsilon$ violaceum . . . . .	c	id.			

## Lis du Japon.

Les Lis japonais en commerce étant pour la plus part des espèces mal déterminées ou des variétés gagnées par des graines, il est d'importance pour les horticulteurs et les amateurs de posséder des pieds des plantes primitivement introduites du Japon par nous et cultivées dans notre établissement, où dès semis ne furent admis jusqu'aujourd'hui. Les lis nouvellement introduits dès 1852 dans notre établissement se distinguent par la forme, la grandeur et la couleur des fleurs. Le *Lilium Takesima*, dont une variété a probablement servi de type du *Lilium japonicum* de Thunberg, entre dans la catégorie du *Lilium Brownii* dont il est distingué par la corolle plus grande (de 18 à 20 centimètres, et par les stries rouges pourprées des pétales. Le *Lilium Thunbergii grandiflorum* surpasse en grandeur et splendeur de couleurs tous les lis de la section „*Eulirion*,” tandis que les lis *Coridion* et *Partheneion* l'un à fleurs de carmin, l'autre d'un jaune d'or, nous rappellent les tulipes, les *Ducs* simples, par leur forme gracieuse et leurs couleurs vives et brillantes. Notre *Lilium speciosum latifolium* surpasse toutes les autres variétés de cette espèce recherchée par la grandeur et le rouge vif des pétales. La *Sarana* remarquable par ses fleurs à velours noir mérite non seulement comme plante d'ornement l'attention des horticulteurs, mais aussi comme plante alimentaire. Les bulbes de cette liliacée fournissent aux Kamtschadales et à plusieurs peuples de la Sibérie orientale la nourriture végétale dans la longue saison d'hiver. Les bulbes des lis sans exception sont mangées par les Japonais crues, roties et confies, et c'est une variété du lis tigré (*Lilium tigrinum*) qui est recherchée par eux de préférence. La multiplication facile de cette plante bulbeuse qui résiste à la rigueur de l'hiver pourrait la ranger entre les plantes alimentaires les plus utiles de l'Europe.

Noms botaniques.	Clima.	Usage.	Prix suivant la force		
			A	B	C
	fr.		10	15	
* <i>Lilium Coridion</i> Sieb. et de Vries. . . . .					
— longiflorum Thbg. . . . .				1	
— — var. $\epsilon$ Lükü . . . . .				2	
— — fol. varieg. . . . .				3	
— * <i>Partheneion</i> Sieb. et de Vries. . . . .			25	50	
— speciosum Thbg. var. album. . . . .			1	2	
— — latifolium . . . . .			2	5	
— — punctatum . . . . .			1	3	
— — rubrum . . . . .			2	5	
— japonicum Thbg. var. Takesima S. et de Vr. . . . .			10	15	25
— Thunbergianum Schult. var. fulgens . . . . .				5	
— — atrosanguineum Hort. . . . .				5	



Noms botaniques.	Climat.	Usage.	Prix suivant la force.		
			A	B	C
Lilium Thunbergianum grandiflorum Sieb. . . . .	fr.		5	10	20
— — pictum Sieb. . . . .			2	5	
— venustum Kunth. . . . .			1	2	4
— tigrinum Gaiol. var. Jap. . . . .				1	2
— — *fol. variegat. . . . .					
Saranea camtschatica Fisch. var. jap. . . . .			15	25	
(Le Kuro-juri ou lis noir du Japon.)					

## Ignames du Japon.

### Dioscorea opposita Thbg. 1).

Un tronçon de racines 2) . . . . .	Fr. 1
six tronçons " " . . . . .	" 4
La douzaine . . . . .	" 6
Dioscorea sativa Linn. 3) . . . . .	" 1

1) C'est une variété de culture de l'Ignome introduite de la Chine en France et décrite par M. Decaisne sous le nom de *Dioscorea Batatas*. Cependant Kaempfer et Thunberg, ces célèbres voyageurs du 16<sup>me</sup> et 17<sup>me</sup> siècle, ont déjà observé cette Ignome au Japon; le premier en a fait mention sous le nom indigène de *Tsukune imo* et le dernier la signalée par le nom de *Dioscorea opposita* en citant comme synonyme la *D. oppositifolia* de Linné et le *Tsukune imo* de Kaempfer; M. Decaisne lui-même a vu et reconnu notre Ignome japonaise identique comme espèce avec la plante introduite en France de la Chine. Nous avons donc provisoirement conservé à notre Ignome qui se distingue par des caractères spécifiques de la *D. japonica* Thbg. et la *D. sativa* Linn. que nous avons également retrouvé au Japon, le nom que Thunberg lui a donné. L'Ignome japonaise ne mérite pas seulement l'attention des cultivateurs comme variété nouvelle de la plante substituée aux batates, mais aussi à cause de son origine d'un pays où la température moyenne de l'été qui ne surpasse pas 20° de Reaum. ou 77° de Fahr., est moins élevée que dans l'arrondissement de Sanghae d'où la plante chinoise fût envoyée en France.

2) Nous livrons des tronçons de racines pourvus de bourgeons et non pas des petites tubercules, qui naissent dans les aisselles des feuilles, et qui se ne développent que par la culture de plusieurs années.

3) Cette espèce, déjà introduite du Japon par nous en 1830 fût négligée depuis comme plante usuelle, et nous la recommandons aux cultivateurs pour en essayer la culture.



## Souscription

### aux quatre variétés des Batates douces.

(Batatas edulis.)

Ces nouvelles variétés <sup>1)</sup> des Batates douces introduites du Japon au mois de juin 1855 dans notre établissement et plantées en pleine terre ont provoqué l'admiration des horticulteurs et des botanistes par le développement rapide et abondant de leurs racines tuberculeuses, qui déjà au mois de Septembre ont acquis une longueur de 30 Centim. et de 4 Centim. d'épaisseur. Ce fait remarquable constaté par la lettre patente d'un savant distingué Mr. le professeur de Vriese à Leide répandue depuis dans les journaux, nous dispense de faire des éloges à notre introduction importante, surtout pour les pays de l'Europe situés sous les isothermes moyennes de l'année de 8° à 12° de Raum. ou 50 à 59° Fahrh. Toute l'Europe agrogonomique vient de s'intéresser pour la culture de nos Batates douces dont nous présentons :

Une jeune plante de quatre variétés à	. . . . .	Fr. 10
trois jeunes plantes de	" " "	" 15
six	" " " " " "	" 25

Nous prendrons soin de nôter les commandes d'après leurs dates; mais à cause de la sensibilité des jeunes plantes à l'humidité et au froid, l'envoi n'en aura lieu qu'au commencement du mois de mai suivant l'ordre de la souscription.

## Groupes Physiognomiques de Plantes du Japon.

Alexander de Humboldt, ce savant et ingénieux naturaliste, a avancé le premier dans son ouvrage, connu au monde littéraire sous le titre de *Kosmos*, l'heureuse idée de faciliter et d'encourager l'étude de la nature végétale en groupant soit dans des parterres en pleine terre, soit dans des serres chaudes ou froides différentes plantes exotiques, propres à rendre un tableau caractéristique de la Flore des pays étrangers, et de récompenser ainsi de leur zèle et de leur dévouement pour l'horticulture les amateurs et les cultivateurs de plantes, attachés au foyer paternel, par l'aspect des groupes de plantes représentant la végétation des pays les plus éloignés de leur patrie.

Notre collection de plantes japonaises riche en individus très forts et propres pour la culture en pleine terre, nous permet de présenter aux amateurs des assortiments d'arbres, d'arbrisseaux et de plantes vivaces choisis par nous et rangés d'après leur port et leur grandeur naturelle de manière à représenter dans un parterre un tableau physiognomique de la Flore du Japon.

---

<sup>1)</sup> Elles se distinguent par la figure ou la circonscription des feuilles, et par la couleur extérieure des racines qui sont blanches, jaune-pâles, rouges ou roses.



Le prix est fixé:

Pour une groupe de 5) plantes différentes pour pleine terre à . . Fr. 60  
 " " " " 25 " " " " " " " " à . . " 25

**Collections botaniques de plantes japonaises.**

Pour les horticulteurs et les amateurs botanistes, les instituts et les écoles d'horticulture.

Une collection de 100 jeunes plantes avec les noms exactement déterminés Fr. 50  
 " " " 50 " " " " " " " " " " 20

Les *Camellia*, *Azalia* et *Magnolia* répandues dans le commerce n'entrent pas dans nos groupes physiognomiques et dans nos assortiments botaniques.

On peut se procurer dans notre établissement toutes les espèces et les variétés des plantes de la Chine introduites et cultivées en Europe.

**Graines de plantes potagères et agricoles récoltées en  
 automne 1855 au Japon.**

Nro.	Noms botaniques.	Usage.	un petit paquet. Fr.
1	<i>Brassica chinensis</i> Linn. deux variétés à siliques courtes et larges . . . . .	Pl. pot. et oléa.	1
2	— — — — — trois variétés à siliques allongées . . . . .	Pl. oléagin.	1
3	— — — — — dix variétés en mélange . . . . .	id.	2
4	— — — — — <i>orientalis</i> Linn. trois variétés . . . . .	id.	1
5	— — — — — <i>Rapa</i> Linn. var. Jap. . . . .	Pl. potag.	1
6	<i>Fagopyrum tataricum</i> Gärt. trois variétés . . . . .	Pl. agric.	1
7	<i>Gossypium herbaceum</i> Linn. var. Jap. six grains . . . . .	Pl. à coton.	1
8	<i>Hordeum hexastichon</i> Linn. nudum (himalayense) <sup>1)</sup> . . . . .	Pl. céréale.	1
9	<i>Lactuca sativa</i> Linn. var. Jap. <i>Tsisa</i> <sup>2)</sup> . . . . .	Pl. potagère.	1
10	<i>Lappa edulis</i> Sieb. <sup>3)</sup> . . . . .	id.	1
11	<i>Nicotiana sinensis</i> Fisch. var. Jap. . . . .	Pl. à Tabac.	2
12	<i>Oryza sativa</i> Linn. six variétés en mélange <sup>4)</sup> . . . . .	Pl. céréale.	2
13	— — — — — var. jap. Motsi (à gâteau) . . . . .	id.	1
14	— — — — — No-ine (riz de champ) . . . . .	id.	1
15	— — — — — Sanbo (à trois épis) . . . . .	id.	1
16	— — — — — <i>praecox</i> Lour. ( <i>Wase</i> ) <sup>5)</sup> . . . . .	id.	2
17	— — — — — <i>praecocissima</i> ( <i>Sjûhats'momi</i> ) <sup>6)</sup> . . . . .	id.	2
18	— — — — — <i>montana</i> Lour. <sup>7)</sup> douze graines . . . . .	id.	2

1) Cette variété d'orge à six rangs et à graines nues est généralement cultivée au Japon à cause de sa précocité et fertilité. Des graines semées au mois de Juin on peut faire une bonne récolte en automne.

2) Cette nouvelle laitue qui nous rappelle le *Housung* des Chinois et la laitue romaine, est un légume très sain et propre à être salé.

3) On en mange les racines comme chez nous les scorsonères.

4) Assortiment de dix variétés de riz les plus recherchées au Japon.

5) Celle-ci et la suivante sont les variétés les plus précoces; semées au mois de Mai on en fait la récolte au mois d'Aout.

6) Le nom *Sjûhats'momi* c. a. d.: riz de quatre vingt jours, signale la précocité de cette variété.

7) C'est le véritable riz de montagne qui est cultivé au Japon dans les champs plus élevés et secs (sans arrosement artificiel), espèce distinguée de toutes les autres variétés connues par la graine très allongée et plus mince et par la couleur rose de l'épiderme de la graine. La glume est sans arête.



Nro.	Noms botaniques.	Usage.	un petit paquet.
			Fr.
19	<i>Panicum italicum</i> Linn. <sup>1)</sup> quatre variétés à grain. jaun.	Pl. céréale.	1
20	— — variété à graines pailles . . . . .	id.	1
21	— à graines jaunes et pailles . . . . .	id.	1
22	<i>Phaseolus Mungo</i> Linn. <sup>2)</sup> à graines vertes, rouges et pailles . . . . .	id.	1
23	<i>Pisum sativum</i> var. de pois communs . . . . .	Pl. potagère.	1
24	— — var. Jap. variété de pois carrés . . . . .	id.	1
25	<i>Raphanus sativus</i> Linn. <sup>3)</sup> var. Jap. dix variét. en mélange	Pl. potagère.	3
26	— — à graines oléagineuses, trois var. en mélange . .	Pl. oléagin.	2
27	<i>Sinapis chinensis</i> Linn. var. Jap. . . . .	Pl. de moutar.	1
28	<i>Soja japonica</i> Sari <sup>4)</sup> à graines blanch. vert. et noir. .	Pl. à Soy.	1
29	<i>Sorghum saccharatum</i> Pers. ( <i>Holcus saccharatus</i> ) <sup>5)</sup> .	Céréale.	1
30	<i>Vicia Faba</i> Linn. minor. var. Jap. . . . .	Pl. potag.	1
	Toute la collection . . . . .		25

Les graines sont conservées dans des petites boîtes et soigneusement emballées dans un carton. Il n'y a que vingt collections disponible.

## A v i s.

M. M. les horticulteurs et amateurs qui voudront nous honorer de leurs commandes, sont priés de les indiquer sur la lettre ci-jointe et de la faire parvenir franco à notre adresse à Leide (Hollande) ou à Bonn (Prusse rhénane.)

Aux membres contribuant de la Société Royale pour l'Encouragement de l'Horticulture dans les Pays-Bas et aux Jardins botaniques sera accordé une remise de 10 p. C.

1) La culture antique du millet en Chine et au Japon qui s'étend jusqu'aux limites boréales de ces empires, a produit des variétés précieuses, dont nous présentons un assortiment choisi.

2) On mange ces pois cuits avec du riz; on en prépare aussi de la salade, en les faisant germer durant quelques jours dans l'eau tiède.

3) Chez les Chinois et les Japonais, ces peuples oryzivores, les fruits, les herbes et racines salés sont indispensables pour donner saveur à la préparation simple et insipide du riz cuit dans l'eau.

4) C'est la plante légumineuse, des graines de laquelle les Japonais préparent le Soy (*Sojû*). sauce bien connue aux gourmands.

5) Les graines du sorgho sucré se mangent au Japon. C'est une variété de l'espèce introduite de la Chine et cultivée en France, dont le vésou peut donner un sucre analogue à celui que l'on extrait de la canne des tropiques.



# Table alphabétique des plantes figurées dans la Flore du Japon <sup>1)</sup>.


<i>Akebia quinata</i> <i>Decaisne</i>	. . . . .	Vol. I.	Tab. 76.
<i>Anemone japonica</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 5.
<i>Camellia japonica</i> <i>L.</i>	. . . . .	" "	" 82.
— <i>Sasanqua</i> <i>Thunb.</i>	. . . . .	" "	" 83.
<i>Campanumoea lanceolata</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 91.
<i>Cephalotaxus drupacea</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	Vol. II.	Tab. 130. 131.
— <i>pedunculata</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 132.
<i>Corylopsis spicata</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	Vol. I.	Tab. 19.
<i>Cryptomeria japonica</i> <i>Don.</i>	. . . . .	Vol. II.	Tab. 124 b. 124.
<i>Cunninghamia sinensis</i> <i>Rich.</i>	. . . . .	" "	" 103. 104.
<i>Deutzia crenata</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	Vol. I.	Tab. 6.
— <i>gracilis</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 8.
<i>Diervilla hortensis</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 29. 30. 32.
<i>Eriobotrya japonica</i> <i>Lindl.</i>	. . . . .	" "	" 97.
<i>Helwingia rusciflora</i> <i>Willd.</i>	. . . . .	" "	" 86.
<i>Illicium religiosum</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 60.
<i>Juniperus japonica</i> <i>Sieb.</i>	. . . . .	Vol. II.	Tab. 127.
— <i>procumbens</i> <i>Sieb.</i>	. . . . .	" "	" 126.
<i>Kadsura japonica</i> <i>Juss.</i>	. . . . .	" I.	" 17.
<i>Kerria japonica</i> <i>D.C. fl. simpl.</i>	. . . . .	" "	" 98.
<i>Ligularia gigantea</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 36.
— <i>Kaempferi</i> <i>D.C.</i>	. . . . .	" "	" 35.
<i>Lilium speciosum</i> <i>Thunb.</i>	. . . . .	" "	" 12. 13.
<i>Lychnis grandiflora</i> <i>Jacq.</i>	. . . . .	" "	" 48.
<i>Paulownia imperialis</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 10.
<i>Pinus Massoniana</i> <i>Lamb.</i>	. . . . .	" II.	" 113. 114.
— <i>densiflora</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 112.
<i>Podocarpus macrophylla</i> <i>Wall.</i>	. . . . .	" "	" 133.
— <i>Maki</i> <i>Sieb.</i>	. . . . .	" "	" 134.
— <i>Nageja</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 135.
<i>Prunus Mume</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" I.	" 11.
<i>Quercus glabra</i> <i>Thunb.</i>	. . . . .	" "	" 89.
<i>Raphiolepis japonica</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 85.
<i>Retinospora squarrosa</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" II.	" 123.
<i>Salisburia adianthifolia</i> <i>Smith</i>	. . . . .	" "	" 136.
<i>Spiraea prunifolia</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" I.	" 70.
<i>Tamarix chinensis</i> <i>Lour.</i>	. . . . .	" "	" 71.
<i>Ternstroemia japonica</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 80.
<i>Tetranthera japonica</i> <i>Spreng.</i>	. . . . .	" "	" 87. 100.
<i>Thuja pendula</i> <i>Lamb.</i>	. . . . .	" II.	" 117.
<i>Thujopsis dolabrata</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 120. 119.
<i>Torreya nucifera</i> <i>Don.</i>	. . . . .	" "	" 129.
<i>Viburnum plicatum</i> <i>Thunb.</i>	. . . . .	" I.	" 37.
<i>Wisteria brachybotrys</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 45.
— <i>japonica</i> <i>S. et Z.</i>	. . . . .	" "	" 43.
— <i>sinensis</i> <i>D.C. var. jap.</i>	. . . . .	" "	" 44.

1) *Flora Japonica*, sive plantae, quas in imperio Japonico collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingendas curavit Ph. Fr. de Siebold. Sectio prima. Plantae ornatui vel usui inservientes. Digessit Dr. J. G. Zuccarini. Vol. I. et II. avec 200 planches coloriées ou en noir. (s'adresser à l'auteur-éditeur Mr. von Siebold.)











**pour pleine terre.**

